

CADERNO DE QUESTÕES

ENFERMEIRO OBSTETRA/OBSTETRIZ

DATA: 20 / 10 / 2019

NÍVEL SUPERIOR

NOME DO CANDIDATO: _____

NUMERO DE INSCRIÇÃO:

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

1. Este **CADERNO DE QUESTÕES** contém **45 (quarenta e cinco) QUESTÕES** de múltipla escolha referente a Prova Objetiva, correspondentes ao cargo de sua concorrência.
2. Cada questão objetiva de múltipla escolha apresenta **4 (quatro)** alternativas identificadas com as letras **A, B, C, e D** sendo apenas **1 (uma)** correta.
3. Confira se o seu **CADERNO DE QUESTÕES** contém a quantidade de questões descritas no item 1 e se o **cargo** para o qual você foi inscrito está correto. Caso esteja incompleto ou apresente qualquer defeito comunique imediatamente ao fiscal de sala, para que seja realizada a substituição.
4. Observe, na **FOLHA DE RESPOSTAS**, se seus dados estão registrados corretamente. Caso haja alguma divergência, comunique ao fiscal de sala.
5. Após conferência, assine seu nome no espaço próprio na **FOLHA DE RESPOSTAS**.
6. **OBRIGATORIAMENTE** a **FOLHA DE RESPOSTAS** deverá ser preenchida com caneta esferográfica feita em material transparente de tinta preta ou azul.
7. **Não é permitida**, no momento da prova, a comunicação entre os candidatos, bem como a utilização de aparelhos eletrônicos (calculadora, telefone celular, tablet, etc.), óculos escuros, protetor auricular, boné, relógios, livros, anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta.
8. A saída de candidato da sala de prova somente será permitida depois de transcorrido o tempo de **01 (uma) hora do início da prova** (apontado em sua sala de prova), mediante a entrega obrigatória, da sua folha de respostas e do seu caderno de questões, ao fiscal de sala.
9. O candidato poderá, ao terminar sua prova, levar o Caderno de Questões **SOMENTE** faltando **30 (trinta) minutos** para o tempo previsto do seu término.
10. O tempo disponível para a prova é de **04 (quatro) horas**.
11. Será eliminado do concurso e terá sua prova anulada, o candidato (a) que: **NÃO ASSINAR A LISTA DE PRESENÇA** e/ou a **FOLHA DE RESPOSTAS**.
12. Os três últimos candidatos, ao terminar a prova, só poderão sair juntos.

BOA PROVA!

DESTAQUE AQUI

01		06		11		16		21		26		31		36		41	
02		07		12		17		22		27		32		37		42	
03		08		13		18		23		28		33		38		43	
04		09		14		19		24		29		34		39		44	
05		10		15		20		25		30		35		40		45	

LÍNGUA PORTUGUESA

TEXTO PARA AS QUESTÕES 01 A 05

Projeto estimula leitura em crianças e jovens de hospital da UFF

Ideia que começou em 2017 expande-se e conquista pais e pacientes

O relato positivo das equipes médicas dos setores de psiquiatria e neurologia pediátricas garantiu a continuidade do projeto de estímulo à leitura para crianças e jovens que aguardam atendimento no Hospital Universitário Antonio Pedro (Huap), da Universidade Federal Fluminense (UFF), em Niterói (RJ).

O projeto foi iniciado em 2017 pela psiquiatra Valéria Pagnin, chefe do Departamento de Psiquiatria e Saúde Mental do Huap e coordenadora da iniciativa, e sua parceira, a pedagoga e técnica em assuntos educacionais Lílian Silva. As duas começaram a ideia sem associação a nenhuma pesquisa.

“É um projeto de extensão, de estímulo à leitura. O que a gente colheu de dados informalmente, com os médicos, é que as crianças entram para as consultas mais tranquilas”, explica Lílian. Ela acrescenta que as crianças e jovens ficam mais tranquilos e mais motivados: “Está dando supercerto. A gente está muito feliz com o projeto.”

Segundo Valéria, a leitura é uma maneira de a pessoa ver e interpretar o mundo em que vive. “E essa leitura precisa ultrapassar os limites da visão física e auditiva para ocupar também a ótica da fantasia”, ressalta.

Com base no interesse das crianças e adolescentes, muitos pais, mães e responsáveis pelos pacientes também começaram a ler os livros. Eles sentam-se nas cadeiras de leitura, pegam os livros e levam para casa. Uma das maiores preocupações de Valéria e Lílian é como poderão continuar alimentando as estantes. Elas não propõem uma biblioteca, em que a pessoa pega um livro emprestado e devolve. “A proposta é que o livro siga em frente. Por isso estou sempre agoniada, procurando mais doações”, declara Lílian.

Segundo a pedagoga, as bibliotecas populares municipais Cora Coralina e Anísio Teixeira, de Niterói, ajudam o projeto com doações de livros. “O projeto só sobrevive com a doação de livros”, afirma.

Até o fim do ano, será levantado o número de crianças e adolescentes beneficiados até agora pelo projeto. A iniciativa estendeu-se para os funcionários do hospital e as pessoas que fazem exames médicos. “O projeto acabou encantando outras pessoas”.

Também professora da rede municipal de ensino de Niterói, Lílian Silva revelou que, das 92 escolas municipais da cidade, só cinco têm bibliotecas escolares, apesar de a Lei 12.244/2010 determinar que todas as escolas devem ter uma biblioteca. Segundo Lílian, as bibliotecas populares acabam dando um suporte necessário para atender a alunos e professores, além de oferecerem contação de histórias e várias atividades ligadas aos livros.

Disponível em: <http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2019-07/projeto-estimula-leitura-em-criancas-e-jovens-de-hospital-da-uff>

QUESTÃO 01

Um dos principais benefícios, citado no texto, do programa de estímulo à leitura para crianças e jovens é:

- (A) O fortalecimento de estudos psiquiátricos e neurológicos.
- (B) Tornar as consultas de crianças e jovens menos estressantes.
- (C) A capacidade de educar os responsáveis pelos pacientes.
- (D) Levar os pacientes para as escolas próximas do local do projeto.

QUESTÃO 02

De acordo com a ortografia oficial, a palavra destacada em “Está dando **supercerto**” está:

- (A) Grafada corretamente, pois o termo possui dois radicais aceitos pela norma padrão.
- (B) Grafada corretamente, pois o prefixo *super* pode se juntar com palavra que comece com *c*.
- (C) Grafada incorretamente, pois o prefixo *super* requer necessariamente a utilização de hífen.
- (D) Grafada incorretamente, pois o termo é uma locução adjetiva que deveria estar dividida.

QUESTÃO 03

No texto percebe-se a ocorrência da palavra **Niterói**. De acordo com as regras de acentuação, ela é acentuada pela:

- (A) Ocorrência de hiato precedido por *r*.
- (B) Ocorrência de ditongo aberto em palavra paroxítona.
- (C) Ocorrência de ditongo aberto em palavra oxítona.
- (D) Ocorrência de um hiato tônico.

QUESTÃO 04

Verifica-se uma oração subordinada adjetiva restritiva em:

- (A) As duas começaram a ideia sem associação a nenhuma pesquisa.
- (B) Uma das maiores preocupações de Valéria e Lílian é como poderão continuar alimentando as estantes.
- (C) A iniciativa estendeu-se para os funcionários do hospital e as pessoas que fazem exames médicos.
- (D) Também professora da rede municipal de ensino de Niterói.

QUESTÃO 05

Dentre as acepções da palavra destacada em “A proposta é que o livro siga em frente. Por isso estou sempre **agoniada**, procurando mais doações”, a única que NÃO acarretaria mudança ao sentido do enunciado, seria:

- (A) Inquieta.
- (B) Enjoada.
- (C) Abafada.
- (D) Vexada.

LEGISLAÇÃO**QUESTÃO 06**

Com base na legislação brasileira vigente a Conferência de Saúde é considerada uma das instâncias colegiadas que compõe o Sistema Único de Saúde (SUS). Destarte, sobre a referida Conferência, assinale a opção **INCORRETA**:

- (A) Se reunirá a cada quatro anos para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde.
- (B) Será convocada pelo Poder Executivo a cada quatro anos ou, extraordinariamente, pelo Conselho de Saúde.
- (C) Terá suas normas de funcionamento e organização definidas em regime próprio, aprovadas pelo próprio conselho.
- (D) Se reunirá a cada quatro anos convocada pelo poder Judiciário ou, extraordinariamente, pelo Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde.

QUESTÃO 07

“O Fundo Nacional de Saúde (FNS) é o gestor financeiro dos recursos destinados ao Sistema Único de Saúde (SUS), na esfera federal. Com a missão de contribuir para o fortalecimento da cidadania, mediante a melhoria contínua do financiamento das ações de saúde, o Fundo Nacional de Saúde busca, cotidianamente, criar mecanismos para disponibilizar informações para toda a sociedade, relativas a custeios, investimentos e financiamentos no âmbito do SUS.”

Disponível em: <http://portalfns.saude.gov.br/sobre-o-fns>.

Destarte, os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão disponibilizados como:

- (A) Investimentos previstos no Plano Bienal do Ministério da Saúde.
- (B) Cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos Municípios, Estados e Distrito Federal.
- (C) Despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades, da administração direta, excluindo-se a indireta;
- (D) Investimentos previstos em lei orçamentária, de iniciativa do Poder Executivo e aprovados pelo Congresso Nacional;

QUESTÃO 08

O Sistema Único de Saúde (SUS) contará, em cada esfera de governo, com instâncias colegiadas, entre elas o Conselho de Saúde. Assim, sobre este Conselho é **INCORRETO** afirmar:

- (A) É um órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários.
- (B) As decisões tomadas no Conselho serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo.
- (C) A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos.
- (D) A organização e normas de funcionamento são definidas por lei complementar, aprovada pelo poder legislativo.

QUESTÃO 09

Quanto ao destino dos recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS), para cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos Municípios, Estados e Distrito Federal, podemos afirmar que:

- (A) Serão destinados, cinquenta por cento aos Municípios e cinquenta por cento aos Estados.
- (B) Serão destinados, setenta por cento, aos Municípios, dez por cento aos Estados e dez por cento à União.
- (C) Serão destinados, pelo menos setenta por cento, aos Municípios, afetando-se o restante aos Estados.
- (D) Serão destinados, pelo menos sessenta por cento, aos Municípios, afetando-se o restante aos Estados.

QUESTÃO 10

Para receberem os recursos de cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados, os Municípios, os Estados e o Distrito Federal deverão possuir com alguns requisitos e setores para devido recebimento, dentre eles, a Comissão de elaboração do Plano de Carreira, Cargos e Salários (PCCS). Quanto ao prazo previsto para a implantação da referida Comissão é correto afirmar que:

- (A) É previsto prazo de dois anos para sua implantação.
- (B) É previsto prazo de quatro anos para sua implantação.
- (C) É previsto prazo de seis anos para sua implantação.
- (D) É previsto prazo de dez anos para sua implantação.

QUESTÃO 11

No que diz respeito à seção II, Art. 198, da Constituição Federal de 1988, assinale a opção correta quanto as diretrizes das ações e serviços públicos de saúde que integram a rede regionalizada e hierarquizada do Sistema Único de Saúde (SUS):

- (A) Descentralização, com direção única em cada esfera de governo.
- (B) Atendimento parcial, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais;
- (C) Centralização, com direção única em cada esfera de governo.
- (D) Atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, com prejuízo dos serviços assistenciais;

QUESTÃO 12

Conforme o que preceitua a Constituição Federal de 1988, o Sistema Único de Saúde (SUS) possui atribuições e competências. No que tange às competências, assinale a opção **INCORRETA**:

- (A) Fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano.
- (B) Participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico.
- (C) Colaborar na proteção do meio ambiente, não compreendendo o ambiente de trabalho.
- (D) Ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde.

QUESTÃO 13

Sobre a Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego nº 485/05, que regulamenta a NR 32, assinale a assertiva correta quanto à finalidade do referido dispositivo normativo.

- (A) Tem por finalidade estabelecer e fiscalizar as diretrizes básicas para a implementação de medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores dos serviços de saúde, bem como o pessoal de apoio.
- (B) Tem por finalidade estabelecer as diretrizes básicas para a implementação de medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores dos serviços de saúde, bem como daqueles que exercem atividades de promoção e assistência à saúde em geral.
- (C) Tem por finalidade fiscalizar e orientar as diretrizes básicas para a implementação de medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores dos serviços de saúde, bem como daqueles que exercem atividades de promoção e assistência à saúde em geral.
- (D) Tem por finalidade fiscalizar e regular as diretrizes básicas para a implementação de medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores dos serviços de saúde, bem como daqueles que exercem atividades de promoção e assistência à saúde em geral.

QUESTÃO 14

No que diz respeito ao Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA, previsto no ANEXO I, da Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego nº 485/05, marque a opção **INCORRETA**:

- (A) Deve conter, na fase de conhecimento, a avaliação do local de trabalho e do trabalhador, considerando a possibilidade de exposição.
- (B) Deve ser reavaliado 01 (uma) vez ao ano e sempre que se produza uma mudança nas condições de trabalho, que possa alterar a exposição aos agentes biológicos.
- (C) Os documentos que compõem o PPRA deverão estar disponíveis aos trabalhadores.
- (D) Deve ser reavaliado 02 (duas) vezes ao ano e quando a análise dos acidentes e incidentes assim o determinar.

QUESTÃO 15

A Lei 8.080/1990 prevê que o atendimento domiciliar e a internação domiciliar são estabelecidos no âmbito do Sistema Único de Saúde. Sobre a internação domiciliar é **CORRETO** afirmar:

- (A) Poderá ocorrer mesmo sem indicação médica, basta o paciente ou sua família solicitarem.
- (B) Só poderá ser realizada por indicação médica, com expressa concordância do paciente e de sua família.
- (C) Poderá ser realizada por indicação médica, com expressa autorização da família, mesmo sem autorização do paciente.
- (D) Poderá ser realizada com concordância tácita do paciente, mesmo que sua família não concorde.

CONHECIMENTO ESPECÍFICO**QUESTÃO 16**

Sabendo que o Zika vírus pode ser transmitido via placentária, o Ministério da Saúde confirmou no último mês a relação entre o vírus Zika e o surto de microcefalia na região Nordeste, assinale assim a alternativa correta a respeito da Microcefalia:

- (A) A microcefalia é uma malformação congênita, em que o cérebro não se desenvolve de maneira adequada.
- (B) Os bebês nascem com perímetro cefálico (PC) menor que o normal, que habitualmente é superior a 40 cm.
- (C) A microcefalia causada pelo zika vírus é uma situação anômala, pois raramente os vírus podem causar microcefalia.
- (D) O diagnóstico da microcefalia é feito somente através da avaliação do perímetro encefálico.

QUESTÃO 17

No conhecimento das vacinas administradas durante a gestação, assinale o imunizante contraindicado no período gestatório:

- (A) Hepatite B.
- (B) Sarampo.
- (C) Influenza.
- (D) Tríplice Bacteriana.

QUESTÃO 18

Sobre a Resolução que Dispõe sobre a atuação de Enfermeiros na assistência às gestantes, parturientes e puérperas, marque a alternativa correta:

- (A) A resolução é de 15 de março de 2016.
- (B) Garante privativamente ao enfermeiro obstetra a realização de parto distócico.
- (C) À Obstetiz está vetado o exercício de atividades de Enfermagem fora da área obstétrica, exceto em casos de urgência.
- (D) Proibição aos Enfermeiros que não possuam certificado de especialista em Enfermagem Obstétrica assistência de enfermagem à gestante, parturiente, puérpera e ao recém-nascido.

QUESTÃO 19

Sobre PCR e reanimação na gestação assinala a opção incorreta:

- (A) Durante a reanimação o útero deve ser deslocado $\geq 15^\circ$ para esquerda para diminuir a compressão aortocaval e melhorar a hemodinâmica materna.
- (B) Oxigênio é fundamental – ofertar rapidamente e sempre 100%. Hipoxemia deve ser lembrada sempre como possível causa da PCR.
- (C) O tempo ótimo de decisão sobre a cesárea perimortem é até 4 minutos de reanimação e o feto deve ser retirado em até 5 minutos.
- (D) Recomenda-se evitar que se use as drogas para RCP de forma igual a não gestantes.

QUESTÃO 20

A respeito do puerpério imediato, assinala a alternativa incorreta:

- (A) Tem início uma a duas horas após a expulsão da placenta;
- (B) Dura do 1º até 10º dia do pós-parto;
- (C) Lóquio sanguíneo: até o 11º dia com volume variável semelhante a menstruação;
- (D) Formação do globo de segurança de Pinard (útero ao nível da cicatriz umbilical e firmemente contraído).

QUESTÃO 21

“Se não podemos descrever [a enfermagem], não podemos exercer controle sobre ela, obter financiamentos, ensinar, pesquisar ou inseri-la em políticas públicas”.

Disponível em: <http://www.corensc.gov.br/wp-content/uploads/2017/11/CIPE-Flórida.pdf>.

A citação se refere à aprovação da resolução para o desenvolvimento da CIPE (Classificação Internacional Para a Prática De Enfermagem). A respeito da CIPE, marque a opção incorreta:

- (A) Tem o objetivo de descrever os cuidados de enfermagem prestados às pessoas (indivíduos, famílias e comunidades) no âmbito mundial.
- (B) Estabelece uma linguagem comum, unificada, para a prática de enfermagem.
- (C) É uma tecnologia de informação, que proporciona a coleta, o armazenamento e a análise de dados de enfermagem;
- (D) É uma terminologia padronizada, ampla e complexa, que representa o domínio da prática da enfermagem no âmbito nacional.

QUESTÃO 22

Sobre a classificação quanto à idade gestacional, assinala a opção certa:

- (A) Prematuridade extrema - menor que 26 semanas de gestação.
- (B) Prematuridade grave – 28 a 30 semanas de gestação.
- (C) Prematuridade moderada - 31 a 36 semanas de gestação.
- (D) Pós-termo, idade gestacional igual ou maior que 40 semanas.

QUESTÃO 23

Quando associamos o peso à idade gestacional, o recém-nascido (RN) é classificado segundo o seu crescimento intra-uterino. Considerando a classificação quanto ao peso e idade gestacional, assinala a alternativa incorreta:

- (A) RN grande para a idade gestacional (GIG): peso acima do percentil 90.
- (B) RN adequado para a idade gestacional (AIG): peso entre o percentil 10 e 90.
- (C) RN tolerável para a idade gestacional (ATG): peso limítrofe de percentil 10 ou 90.
- (D) RN Pequeno para a Idade Gestacional (PIG): peso abaixo do percentil 10.

QUESTÃO 24

“De acordo com o último relatório da OMS sobre doenças não transmissíveis, não estão a ser feitos os esforços suficientes para reduzir em um terço a taxa de mortalidade prematura por doenças não transmissíveis até 2030. As doenças cardiovasculares são responsáveis pelo maior número de mortes dentro das não transmissíveis, 17,7 milhões por ano, seguidas do cancro, com 8,8 milhões, das doenças respiratórias, 3,9 milhões, e da diabetes, 1,6 milhões. ”.

Disponível em:

<https://www.sns.gov.pt/noticias/2017/09/19/doencas-nao-transmissiveis/>.

De posse do texto, marque a alternativa assertiva sobre as doenças cardiovasculares:

- (A) O Infarto Agudo do Miocárdio decorre do depósito de gordura com obstrução das artérias periféricas do corpo.
- (B) Doença vascular periférica é caracterizada pela ausência ou pela diminuição da circulação sanguínea no coração.
- (C) O Acidente Vascular Cerebral Hemorrágico (AVCH) é causado por sangramento devido a obstrução de um vaso sanguíneo.
- (D) O Acidente Vascular Cerebral Isquêmico (AVCI) é causado, principalmente, pelo infarto agudo do miocárdio, decorrente da obstrução de uma artéria.

QUESTÃO 25

Das opções abaixo assinala a que não apresenta-se como transtorno puerperal:

- (A) Transtorno obsessivo-compulsivo pós-parto.
- (B) Disforia do pós-parto.
- (C) Depressão pós-parto.
- (D) Psicose puerperal.

QUESTÃO 26

Das doenças diagnosticadas pelo teste do pezinho (teste padrão oferecido pelo sistema Único de Saúde), qual sequência está equivocada:

- (A) Anemia falciforme, Hipotireoidismo congênito, Fibrose cística.
- (B) Hiperplasia adrenal congênita (HAC), Deficiência de biotinidase, anemia falciforme.
- (C) Hipertireoidismo, Hiperplasia adrenal congênita (HAC), Fibrose cística.
- (D) Fenilcetonúria, Hipotireoidismo congênito, Anemia falciforme.

QUESTÃO 27

Uma criança que apresenta um sinal geral de perigo deve ser avaliada cuidadosamente. Dentre as opções, qual não representa sinal geral de perigo para criança doente:

- (A) A criança não consegue beber nem mamar no peito.
- (B) Febre acima de 38 graus.
- (C) A criança vomita tudo o que ingere.
- (D) A criança teve convulsões ou movimentos anormais (< 72h).

QUESTÃO 28

O número de evacuações por dia considerado normal varia de acordo com a dieta e a idade da criança. Assinale a alternativa correta sobre os tipos de diarreia.

- (A) Quando uma criança tem diarreia por menos de 14 dias, dizemos que a diarreia é aguda.
- (B) Caso a diarreia dure 14 dias ou mais, é denominada desinteria.
- (C) A diarreia com sangue, com ou sem muco, é chamada persistente.
- (D) A diarreia que permanece por mais de 30 dias, é chamada de crônica.

QUESTÃO 29

Mães, pais, familiares, profissionais de saúde e todas as pessoas que têm papel importante no crescimento e desenvolvimento das crianças devem conhecer os benefícios que a amamentação traz para todas as fases da vida. São benefícios comprovados do aleitamento materno, **EXCETO**:

- (A) Para cada ano que a mulher amamenta, a chance de desenvolver câncer de mama diminui em 6%.
- (B) A criança tem menos chance de desenvolver diabetes tipos 1 e 2.
- (C) A amamentação está associada a um melhor desempenho em testes de inteligência.
- (D) O aleitamento materno exclusivo está relacionado à prevenção de doenças neurológicas como Autismo.

QUESTÃO 30

O câncer de mama não tem somente uma causa. A idade é um dos mais importantes fatores de risco para a doença. Outros fatores que aumentam o risco da doença são, **EXCETO**:

- (A) Obesidade e sobrepeso após a menopausa.
- (B) Não ter tido filhos.
- (C) História familiar de câncer de ovário.
- (D) Segunda gravidez após os 35 anos.

QUESTÃO 31

Sobre as DRC, assinale a alternativa incorreta a respeito dos sinais de doença respiratória crônica:

- (A) Baqueteamento digital.
- (B) Cianose.
- (C) Tosse.
- (D) Respirador bucal.

QUESTÃO 32

A terapia antirretroviral (ART), no entanto, pode prolongar significativamente a vida de muitas pessoas infectadas pelo HIV e diminuir as chances de transmissão da doença. Recentemente (Nota Informativa Nº 03/2018 do Departamento de Vigilância), o esquema TARV pôde ser substituído pelo Dolutegravir em pacientes que apresentarem os critérios, **EXCETO**:

- (A) Pessoa vivendo com HIV em uso de esquema atual que tenham realizado a troca do efavirenz ou nevirapina para IP/r por intolerância e/ou eventos adversos.
- (B) Pessoa vivendo com HIV em tratamento antirretroviral, com carga viral indetectável há 8 meses.
- (C) Pessoa vivendo com HIV em uso de primeiro esquema (sem uso prévio) de tratamento antirretroviral contendo efavirenz ou nevirapina.
- (D) Pessoa vivendo com HIV em uso de esquemas com efavirenz ou nevirapina, sem falha virológica prévia.

QUESTÃO 33

Assinale a alternativa correta que descreve em ordem cronológica os passos para uma esterilização segura:

- (A) Limpeza e enxague; Inspeção; manutenção com lubrificante; embalagem; esterilização.
- (B) Inspeção; limpeza e enxague; manutenção com lubrificante; embalagem; esterilização.
- (C) Manutenção com lubrificante; limpeza e enxague; inspeção; embalagem; esterilização.
- (D) Limpeza e enxague; manutenção com lubrificante; inspeção; embalagem; esterilização.

QUESTÃO 34

A Sífilis não tratada durante a gestação também está associada a risco significativo de natimortos e morte neonatal. De posse das informações, assinale a alternativa correta sobre a sífilis congênita precoce:

- (A) A síndrome clínica da sífilis congênita precoce surge após o 2º ano de vida.
- (B) Entre as alterações laboratoriais incluem-se: anemia, trombocitopenia, leucocitose.
- (C) Os bebês apresentam frequentemente surdez neurológica e dificuldade no aprendizado.
- (D) Distingue-se da sífilis congênita tardia por apresentar má formação na tíbia em “Lâmina de Sabre”.

QUESTÃO 35

Na Chikungunya os sinais e sintomas são clinicamente parecidos aos da dengue – febre de início agudo, dores articulares e musculares, cefaleia, náusea, fadiga e exantema. Sobre o espectro clínico dessa arbovirose (Chikungunya), marque a alternativa errada:

- (A) A poliartralgia tem sido descrita em mais de 90% dos pacientes com chikungunya na fase aguda.
- (B) O prurido está presente em 25% dos pacientes e pode ser generalizado ou apenas localizado na região palmo-plantar.
- (C) O sintoma mais comum nesta fase crônica é o comprometimento articular com relatos de febre.
- (D) Alguns pacientes podem desenvolver doença vascular periférica, fadiga e sintomas depressivos.

QUESTÃO 36

A Atenção Primária à Saúde (APS) se apresenta como o eixo estruturante do Sistema único de Saúde (SUS) e constitui-se como o primeiro nível de atenção na Rede de Atenção à Saúde (RAS), sendo enfatizada, cada vez mais, sua função de congregar um conjunto de ações de promoção e proteção à saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção da saúde nas dimensões coletiva e individual, por meio de ações gerenciais e sanitárias participativas e democráticas, trabalho em equipe, responsabilização sanitária e base territorial. Com base no texto acima, **são funções essenciais da RAS:**

- (A) Resolver os problemas de saúde da população; organizar os fluxos e contra fluxos dos usuários em um ponto de atenção à saúde, no sistema de serviços de saúde; responsabilizar-se pela saúde dos usuários na Atenção Terciária.
- (B) A Atenção Primária não desenvolve ações para prevenção do câncer do colo do útero, já que é papel da Atenção Secundária, devolver ações de educação em saúde, vacinação de grupos indicados e detecção precoce do câncer e de suas lesões precursoras.
- (C) Na Atenção Secundária e Terciária, o fluxo de encaminhamento e a continuidade da atenção necessária para a garantia da integralidade do cuidado na RAS para o controle do câncer do colo do útero não depende do planejamento dos gestores locais do SUS e de suas equipes técnicas.
- (D) Resolver a grande maioria dos problemas de saúde da população; organizar os fluxos e contra fluxos dos usuários pelos diversos pontos de atenção à saúde, no sistema de serviços de saúde; responsabilizar-se pela saúde dos usuários em qualquer ponto de atenção à saúde em que estejam.

QUESTÃO 37

O Ministério da Saúde, em 2016, lançou as Diretrizes brasileiras para o rastreamento do câncer do colo do útero, com resumo das recomendações iniciais frente às alterações citológicas, orientando os profissionais sobre quais seguimentos devem ser realizados, de acordo com o diagnóstico. Considere a alternativa CORRETA:

- (A) Nas Lesões de Baixo Grau (LSIL), em qualquer faixa etária, repetir o exame em 12 meses.
- (B) Nas células escamosas atípicas de significado indeterminado, possivelmente, não neoplásica (ASC-US), mulher < 25 anos, repetir o exame em 3 anos; e se entre 25 e 29 anos, repetir em 12 meses; se \geq 30 anos, repetir o exame em 6 meses.
- (C) Em qualquer faixa etária, não podendo afastar Lesão de Alto Grau (ASC-H), repetir o exame em 12 meses.
- (D) Nas Lesões de Baixo Grau (LSIL), se \geq 25 anos, deve-se encaminhar a mulher para colposcopia.

QUESTÃO 38

A amamentação é considerada a alimentação ideal para o bebê por contribuir para a redução das doenças infantis e mortalidade infantil, de acordo com o Ministério da Saúde, 2015. Considerando essa afirmativa, marque a alternativa **CORRETA** sobre as definições utilizadas para o aleitamento materno:

- (A) Aleitamento materno: quando a criança recebe leite materno, direto da mama ou extraído da mama, sem adição de outros alimentos.
- (B) Aleitamento materno predominante: quando a criança recebe somente leite humano, direto da mama ou extraído da mama.
- (C) Aleitamento materno complementado: quando a criança recebe, além de leite materno, água ou bebida à base de água, sucos de frutas ou fluidos rituais.
- (D) Aleitamento materno exclusivo: quando a criança recebe somente leite humano, direto da mama ou extraído da mama, sem adição de qualquer outro líquido ou sólido, com exceção de gotas ou xaropes de vitaminas, sais de reidratação oral, minerais e medicamentos.

QUESTÃO 39

O ingurgitamento mamário tem sido uma das principais dificuldades na amamentação. Pode ocorrer em torno do terceiro ao quinto dia após o parto, em decorrência de alguns fatores. Marque a alternativa que julgar **CORRETA**:

- (A) O ingurgitamento ocorre mamário ocorre porque a produção do leite é menor que a demanda.
- (B) O ingurgitamento ocorre mamário ocorre devido início precoce da primeira mamada, sem interferência emocional.
- (C) O ingurgitamento ocorre mamário ocorre devido esvaziamento das mamas e curto intervalo entre as mamadas.
- (D) O ingurgitamento ocorre mamário ocorre devido sedação materna durante e após o parto, especialmente, no caso de cesarianas.

QUESTÃO 40

No pós-parto, a mulher reúne várias condições para ser infectada por *Candida sp.*, devido vários fatores, como: estresse, perda de sangue, uso de medicamentos e noites mal dormidas, criando um cenário favorável a candidíase. A infecção pode acometer apenas a pele do mamilo e da aréola, ou atingir os ductos lactíferos. Marque a alternativa **CORRETA**:

- (A) Na maioria das vezes, o bebê é quem transmite o fungo para a mãe, já que o mesmo é imunodeprimido, podendo ser facilmente contaminado e transmitir para a mãe.
- (B) Para evitar a proliferação do fungo deve-se manter ambientes escuros, quentes e com pouco oxigênio.
- (C) O profissional da saúde deve orientar a mulher a usar sutiãs com conchas protetoras e absorventes de mama.
- (D) A mulher deve manter o mamilo úmido e arejado e não expor as mamas à luz do sol.

QUESTÃO 41

A Lei nº 9.263/96, regulamenta o planejamento familiar, representando uma conquista importante para mulheres e homens no que diz respeito à afirmação dos direitos reprodutivos, contribuindo para a redução da morbimortalidade materna e infantil. Assinale a alternativa **INCORRETA**:

- (A) Possibilita planejar a gravidez em mulheres adolescentes ou com patologias crônicas descompensadas, tais como: diabetes, cardiopatias, hipertensão, portadoras do HIV, entre outras.
- (B) Diminui o número de gestações não desejadas e de abortamentos provocados.
- (C) Diminui o intervalo entre as gestações, contribuindo para diminuir a frequência de bebês de baixo peso e para que eles sejam adequadamente amamentados.
- (D) Diminui o número de cesáreas realizadas para fazer a ligadura tubária.

QUESTÃO 42

O acompanhamento do pré-natal visa assegurar o desenvolvimento da gestação, permitindo o parto de um recém-nascido saudável, sem impacto para a saúde materna. A Organização Mundial da Saúde considera, adequado, que a gestante realize seis ou mais consultas durante o pré-natal. Com base no texto, considere a alternativa **INCORRETA**:

- (A) As consultas deverão ser mensais até a 26ª semana, quinzenais entre 28 e 36 semanas e semanais de 36 a 41 semanas, e após dar alta do pré-natal.
- (B) Quando o parto não ocorrer até a 41ª semana, é necessário encaminhar a gestante para a avaliação do bem-estar fetal, incluindo avaliação do índice do líquido amniótico e monitoramento cardíaco fetal.
- (C) Garantir o acesso à unidade de referência especializada, caso seja necessário.
- (D) Toda gestante tem direito de conhecer e visitar previamente o serviço de saúde no qual irá dar à luz.

QUESTÃO 43

Existem algumas situações que tornam desfavorável o acompanhamento da gestação no pré-natal de baixo risco, devendo a gestante ser referenciada ao pré-natal de alto risco. Porém, alguns fatores permitem a realização do pré-natal pela equipe da atenção básica. Considere a alternativa **INCORRETA**:

- (A) Idade menor do que 15 e maior do que 35 anos.
- (B) Gestantes que exercem ocupação com esforço físico excessivo, carga horária extensa, rotatividade de horário, exposição a agentes químicos, físicos ou biológicos e estresse devem realizar o pré-natal no baixo risco.
- (C) Situação familiar insegura e não aceitação da gravidez, principalmente em se tratando de adolescente, devem ser encaminhadas ao pré-natal de alto risco.
- (D) IMC que evidencie baixo peso, sobrepeso ou obesidade.

QUESTÃO 44

Para ampliar a captação precoce das gestantes, o Ministério da Saúde, por intermédio da Rede Cegonha, incluiu o Teste Rápido de Gravidez nos exames de rotina do pré-natal, que pode ser realizado na própria UBS, o que acelera o processo necessário para a confirmação da gravidez e o início do pré-natal. Se o atraso menstrual for superior a 12 semanas, em 90% das pacientes, o diagnóstico de gravidez poderá ser feito por intermédio dos sinais clínicos. Assinale a alternativa **CORRETA**:

- (A) Paredes vaginais aumentadas, com aumento da vascularização, podendo se observar pulsação da artéria vaginal nos fundos de sacos laterais é um sinal de presunção.
- (B) Manifestações clínicas (náuseas, vômitos, tonturas, salivação excessiva, mudança de apetite, aumento da frequência urinária e sonolência), é um sinal de certeza.
- (C) Modificações anatômicas (aumento do volume das mamas, hipersensibilidade nos mamilos, tubérculos de Montgomery, saída de colostro, coloração violácea vulvar, cianose vaginal e cervical, aumento do volume abdominal, é um sinal de presunção.
- (D) Percepção dos movimentos fetais (de 18 a 20 semanas) é um sinal de probabilidade.

QUESTÃO 45

É importante ressaltar o papel da equipe de saúde na Atenção Básica, no pré-natal, pois são de grande valia em todo o processo: territorialização, mapeamento da área de atuação da equipe, identificação das gestantes e realização do cuidado, tanto no âmbito da unidade de saúde, quanto no domicílio, visando a promoção da saúde, promoção da saúde, prevenção de agravos e escuta qualificada, proporcionando atendimento humanizado e viabilizando o estabelecimento do vínculo. Considere a alternativa **CORRETA**:

- (A) Prescrever medicamentos padronizados para o programa de pré-natal (sulfato ferroso e ácido fólico, além de medicamentos padronizados para tratamento das ISTs, conforme protocolo da abordagem sindrômica, está vetada ao enfermeiro.
- (B) O enfermeiro deve realizar a consulta de pré-natal de gestação de baixo risco intercalada com a consulta médica.
- (C) Cabe ao agente comunitário de saúde, consultar e orientar as gestantes quanto aos fatores de risco e à vulnerabilidade.
- (D) Na equipe de saúde, incumbe privativamente ao médico, identificar as gestantes com algum sinal de alarme e/ou a identificação de gestação de alto risco.

